© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Clausilia Briseis Parr. Janina. Eine so dunkel, wie Itala, gefärbte Cl. stigmatica Ziegl.

Die Unterscheidung zwischen Art und Varietät wird natürlich immer etwas individuell bleiben; auch einige Irrthümer und Missgriffe beim Absenden von Exemplaren können sehr leicht vorkommen und sind durchaus zu entschuldigen. Aber doch dürfte es an der Zeit sein, im Interesse der Käufer und Verkäufer vor dem in Handel bringen neuer Nominalarten zu warnen.

E. v. Martens.

Tauschcatalog

des Tauschvereins der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Clausilia Drp.	S.	Pf
grisea Drp. Nauplia!	1	
Kephissiae Roth. Mt. Parnès bei Athen	1	6
rubicunda Küster „	1	6
saxicola Parr. Athen	1	
laevissima Zgl. Ragusa		10
sulcosa Wagn. „		10
conspurcata Jan „		10
Cattaroensis Zgl. Cattaro		6
binotata Zgl. Spalato		10
aquila Parr. Lagosta	1	6
irregularis Zgl. Ragusa		10
vibex Rossm. Sebenico	1	
strigillata Mühlf. Ragusa.		10
syracusana Phil. Syracus	2	
crassicostata Benoit. Sicilien	2	
Meissneriana Shuttl. Sardinien (Insel)	1	
Pupa Drp.		
pulla Gray. Bengalen	2	
umbilicata Drp. Athen (3 Ex.)		6
scyphus Friv. Nauplia		10
Philippii Cantr. Athen, Nauplia		10
Zonites Montf.		
albanicus Zgl.	5	
carniolicus Schm. Serajewo	2	

	S.	Pf
verticillus Fér. Wien		6
Vitrina Drp.	1	
brevis Fér. Heidelberg (2 Ex.)		
Helix L.		
Codringtonii Gray. Taygetos, alt. 1300 M.	5	
figulina Parr. Athen	3	
cyclolabris Desh. Acropolis b. Athen	2	
Hymetti Mousson. Parnès, Nauplia	3	
Olivieri Fér. Athen	1	
lens Fér. „	2	
rupestris Drp. „ (2 Ex.)		6
virgata Mont. var. Nauplia		6
Orthalicus.		
princeps Brod. Amazonengebiet	3	
zebra Müll. „	3	
Bulimus.		
alternatus Say. Texas	1	6
albicans Brod. Chile	1	6
Atacamensis Pfr. Wüste Atacama	2	
auris leporis Brug. Rio Janeiro	4	
Bengalensis Lam. Calcutta	2	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	S.	Pf
chilensis Lesson. Chile	2	
citrinus Brug. u. var. Java	4	
comes Pfr. Cochinchina	5	
dentatus Wood. Brasilien	2	
Kambeul Brug. (Limicolaria). Westafrika.	8	
dryas Brod. Mindoro	3	
lita Fér. (papyraceus Maw) Brasilien	4	
Lehmanni Pfr, Anguilla, Westindien	8	
Mariae Albers. Texas	1	6
Laurentii Sow. Peru.	1	6
rosaceus King. Valparaiso	3	
Proteus Brod. Peru	6	
derelictus Brod. „	2	
vexillum Wood (varians Brod.) Peru	2	
punctatus Anton. Himalaya	1	6
velutinus Pfr. Seychellen	4	
arcuatus Hutton. Himalaya	3	
Taunaysi Fér. Brasilien	10	
peruvianus Brug. Peru	3	

	S.	Pf
spoliatus Fér. Griechenland	1	
zebriola Fér. „	1	
Cyclostoma.		
rufilabris (Cistula) Beck. St.Croix	2	
megachile (Tudora) Pot.et Mich. Curacao	2	
elegans Müll. Athen!		5
Helicina.		
Sagraiana d'Orb. Cuba	10	
pulcherrima Lea „	4	
neritella var. Jamaica	2	
citrina Grut. „	2	6
solidula Gray. Tahiti	1	
fulva d'Orb. Rio Janeiro	1	6
zephyrina Duc. Mexico	2	
striatula Sow. Jamaica	2	6
Regina (Trochatella) Morel. Cuba	10	
pulchella Gould. Jamaica	2	
Rohri Pfr. Cuba	1	
Pyrena.		
atrata. Celebes	5	

Literaturbericht.

Journal de Conchyliogie, 3 Serie. Tome XI. 1871. Nr. 4.

p. 261. *Fischer*, *P.*, Note complémentaire sur l'anatomie de l'Anostome (nachträgliche Beschreibung der Radula).

p. 263. *Crosse*, *H.*, Distribution géographique et cataloque des espèces actuelles du genre *Voluta*. Es werden nach Abtrennung der Genera Lyria, Cymbium und Volutomitra noch 73 Arten aufgeführt und eine Art, V. concinna Broderip, abgebildet; die von den Engländern (Gray, Adams), neuerdings etablirten Gattungen hat Crosse sehr vernünftig als Untergattungen einer Gattung behandelt; mit zwei neuen von ihm aufgestellten Untergattungen zählt er im Ganzen 16 Sectionen auf.

p. 309. *Hidalgo*, *J. Gonzalez*, Description de trois espèces nouvelles d'Helix d'Espagne. (Hel. Montserratensis pl. XII. Fig. 6, semipicta Fig. 5 und Zapateri Fig. 4, die Diagnosen schon früher (Journ. Conch. 1870 p. 298 ff.) veröffentlicht.

p. 312. *Crosse*, *H.*, Note sur les Coquilles terrestres recueillies par M. le professeur Artôn dans la région supérieure de l'*Amazone* et descriptions d'espèces nouvelles. — 28 Species, davon zum ersten Male abgebildet Helix Artoni, Napensis und Bulimus Ucayalensis.